

FENOMENAL GARDEN

Toelatingsnummer	10132G/B
Doelgroep	Amateurgebruik
Toelatingshouder	BAYER CROPSCIENCE N.V.
Samenstelling	6 % FENAMIDONE 60 % FOSETHYL
Formuleringstype	WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Etikettering	Zie toelatingsakte (bijlage 2)
Aard	Fungicide

Andere vermeldingen

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). - wachttijd tussen toepassing in aardbeien en planten van volggewas: 30 dagen. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - Goedgekeurde verpakking: HDPE flacon van 75 g in kartonnen doos. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te vermelden co-formulanten: / - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Algemene opmerking

Teelt: aardbeien (open lucht) (*Fragaria ananassa*)

Veiligheidsstermijn

Toepassingsstadium Bij het uitplanten

Opmerking

- Het dompelbad kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorkomen dient te worden dat het dompelbad te veel vervuild is. De wortels niet laten uitdrogen na het dompelen. - Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het aanleggen van een volgende aanplanting.

bestrijding van		vijand	vijand
rood wortelrot	De planten gedurende 15 minuten onderdompelen in een oplossing van 15 g Fenomenal Garden in 10 l water. 1-2 toepassingen		

Risicobeperkende maatregelen 1 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Veiligheidstermijn

Toepassingsstadium Na het uitplanten

Opmerking

- Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het aanleggen van een volgende aanplanting.

Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium vijand	Opmerking vijand
rood wortelrot	7,5 g/10 l water, met 100 ml oplossing/plant, 1-2 toepassingen		

Risicobeperkende maatregelen 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Veiligheidstermijn

Toepassingsstadium

Bij het hernemen van de groei, m.a.w in het voorjaar voor aanplantingen aangelegd in de zomer of 21-28 dagen na het uitplanten voor aanplantingen aangelegd in het voorjaar

Opmerking

- Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het aanleggen van een volgende aanplanting.

Ter bestrijding	Dosis	Toepassingsstadium vijand	Opmerking vijand

van

rood - Door aangieten: 7,5 g/10 l water, met 100 ml oplossing/plant -
wortelrot Door bladbespuiting: 22,5 g/10 l water voor 50 m²

**Risicobeperkende
maatregelen**

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: coniferen (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Veiligheidstermijn

Toepassingsstadium

Opmerking

Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium vijand	Opmerking vijand
---------------------	-------	---------------------------	------------------

wortelziekten 7,5 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2 toepassingen met een interval van 30 dagen

**Risicobeperkende
maatregelen**

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Veiligheidstermijn

Toepassingsstadium

Opmerking

Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium vijand	Opmerking vijand
---------------------	-------	---------------------------	------------------

wortelziekten 7,5 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2 toepassingen met een interval van 30 dagen

Risicobeperkende

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

maatregelen

Teelt: sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)(open lucht)

Veiligheidstermijn

Toepassingsstadium Behandelen onmiddellijk na het sterken of het verpotten

Opmerking

Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium vijand	Opmerking vijand
wortelziekten	15 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2 toepassingen met een interval van 30 dagen		

Risicobeperkende maatregelen 10 m afstand houden van oppervlaktewaters.